

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ – СОФИЯ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МАЛАРИЯТА, РИСК ЗА ЗАРАЗЯВАНЕ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ХИМИОПРОФИЛАКТИКА /ПО СЗО-2015 г./

№	Страна	Малариен сезон /месеци/	Разпространение на маларията и риск от заразяване	Вид на причинителя	Резистентност към:	Препарат за химиопрофилактика
1	2	3	4	5	6	7
АФРИКА						
1.	Алжир	10/11-4/5	Малки локални огнища на <i>P.vivax</i> са регистрирани в 6 юго-източни района (Адрар, Ел Оуед, Гхардайя, Илизи, Оуарга, Таманрасет). Изолирано местно разпространение на <i>P.falciparum</i> е било регистрирано в два от най-южните райони. Като цяло рискът в Алжир е незначителен.	<i>P.vivax</i> <i>P. falciparum</i>	- -	Не се налага
2.	Ангола	1-12	Повсеместно.	<i>P.falciparum</i>	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
3.	Бенин	1-12	Повсеместно.	<i>P.falciparum</i>	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
4.	Ботсвана	11-5/6	Северна част: район Ботети, Чобе, Нгамиленд, Окаванго, Тутуме.	<i>P.falciparum</i>	CHL	MEF, MAL, DOX (C) в рисковите райони.
5.	Буркина Фасо	1-12	Повсеместно.	<i>P.falciparum</i>	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
6.	Бурунди	1-12	Повсеместно.	<i>P.falciparum</i>	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
7.	Габон	1-12	Повсеместно.	<i>P.falciparum</i>	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
8.	Гамбия	1-12	Повсеместно.	<i>P.falciparum</i>	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
9.	Гана	1-12	Повсеместно.	<i>P.falciparum</i>	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
10.	Гвинея	1-12	Повсеместно.	<i>P.falciparum</i>	CHL	MEF, MAL, DOX (C)
11.	Гвинея Бисау	1-12	Повсеместно.	<i>P.falciparum</i>	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)

12.	Джибути	1-12	Повсеместно.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
13.	ДР Конго /Заир/	1-12	Повсеместно.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
14.	Египет	6-10	Много малък риск от заразяване в областта Ел Файюм. От 1998г. няма обявени случаи на малария.	P.falciparum P.vivax		-
15.	Екваториална Гвинея	1-12	Повсеместно.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
16.	Етиопия	1-12	Повсеместно под 2000м надморска височина. Няма риск в Адис Абеба.	P.falciparum 60% P.vivax 40%	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
17.	Еритрея	1-12	Повсеместно под 2200м надморска височина. Няма риск в Асмара.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
18.	Замбия	1-12	Повсеместно, включително и Лусака.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
19.	Зимбабве	11-6	Повсеместно под 1200м. надморска височина. Разпространението е целогодишно в долината на Замбези. В Хараре и Булауайо рискът е минимален.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C) в рисковите райони
20.	Камерун	1-12	Повсеместно.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
21.	Кабо Верде	9-11	Ограничен риск на островите Сантяго и Боа Виста (1 случай на местна малария през 2012 г.)	P.falciparum		Репеленти и предпазни мрежи срещу комарите. (A)
22.	Кения	1-12	Повсеместно и целогодишно разпространение, като рискът е сравнително по-малък в Найроби (и над 2500м.) и също в централните, източните и западните провинции, както и в Рифт Вали и Нианза.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
23.	Конго	1-12	Повсеместно.	P.falciparum	CHL, SP	MAL, MEF, DOX (C)
24.	Коморски острови	1-12	Повсеместно.	P.falciparum	CHL, SP	MAL, MEF, DOX (C)
25.	Кот Д'Ивоар	1-12	Повсеместно.	P.falciparum	CHL, SP	MAL, MEF, DOX (C)
26.	Либерия	1-12	Повсеместно.	P.falciparum	CHL, SP	MAL, MEF, DOX (C)

27.	Мавритания	1-12 7-10	Риск има в цялата страна с изключение на северните райони: Дакхлет-Ноуадхибоу и Тирис-Земоур. Риск от малария съществува през дъждовния период в Адрар и Инчири.	P.falciparum	CHL	MEF, MAL, DOX (C)
28.	Остров Мадагаскар	1-12	Повсеместно. С най-висок риск са крайбрежните райони.	P.falciparum	CHL	MEF, MAL, DOX (C)
29.	Майоте	1-12	Има риск главно за тропическа малария.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
30.	Малави	1-12	Повсеместно.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
31.	Мали	1-12	Повсеместно.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
32.	Мароко	5-10	Съвсем ограничен риск в някои селски района в провинция Чэфчаоуен. Няма регистрирани местни случаи от 2005г.	P.vivax	-	-
33.	Мозамбик	1-12	Повсеместно.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL (IV)
34.	Намибия	11-6	Налице е риск в районите Охангвена, Омахеке, Омусати, Ошана, Ошикото и Отжозонджупа. По протежение на реките Каванго, Кунене и район Каприви разпространението е целогодишно.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C) в рисковите райони
35.	Нигер	1-12	Повсеместно.	P.falciparum	CHL	MEF, MAL, DOX (C)
36.	Нигерия	1-12	Повсеместно.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
37.	Руанда	1-12	Повсеместно.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
38.	Сао Томе и Принсипи	1-12	Повсеместно.	P.falciparum	CHL	MEF, MAL, DOX (C)

39.	Свазиленд	1-12	Във всички ниски равнинни райони (предимно Биг Бенд, Мхлуме, Симуние и Тшанени).	P.falciparum	CHL	MEF, MAL, DOX (C) в рискоите региони
40.	Сенегал	1-12	Повсеместно. По-малък риск има от януари до юни в централните западни райони.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
41.	Сомалия	1-12	Повсеместно, като рискът е относително по-нисък и сезонен в северната част на страната и съответно значително по-висок в централната и южните части.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
42.	Судан	1-12	Повсеместно. Рискът е нисък в северната част на страната (сезонен). Висок риск има в централната и южна част на страната. Рискът от малария е много ограничен по крайбрежието на Червено море.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
43.	Сиера Леоне	1-12	Повсеместно.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
44.	Танзания	1-12	Повсеместно, под 1800м.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
45.	Того	1-12	Повсеместно.	P.falciparum	CHL	MEF, MAL, DOX (C)
46.	Уганда	1-12	Повсеместно, включително и в главните градове: Форт Портал, Джинджа, Кампала, Мбале и Кигези.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
47.	Централна Африканска Република	1-12	Повсеместно.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
48.	Чад	1-12	Повсеместно.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
49.	ЮАР	1-12	В райони с малка надморска височина в северната част, провинция Мпумаланга (вкл. Нац. Парк “Крюгер”), Лимпопо и североизточен Ква Зулу-Натал на юг до река Тугела. Рискът е целогодишен, но е най-висок от октомври до май.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C) в рисковите райони.

1	<u>2</u>	3	4	5	6	7
АЗИЯ И ОКЕАНИЯ						
1.	Азербайджан	6-10	Съществува ограничен риск от малария в низините, главно в районите между реките Кура и Аракс. Липсва риск в столицата Баку.	<i>P.vivax</i>	-	Предпазване от ухапване на комари (A)
2.	Афганистан	5-11	Под 2000м надморска височина.	<i>P.vivax</i> <i>P.falciparum</i>	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
3.	Бангладеш	1-12	Рискът от малария е целогодишен, но трансмисия на заболяването съществува само в селски райони на 13 от 64 окръга. Най-висок риск съществува в Читагонг и Кокс Базар. Нисък риск съществува в окръзите Нобигонг, Куриграм, Мувивазар, Муменсинг, Нетракона, Шерпур, Сунамгонг и Силхет. В останалата част от страната, както и столицата Дака не са рискови.	<i>P.falciparum</i>	CHL,SP	MEF, MAL, DOX (C)
4.	Бутан	1-12	В южната част на 5 области: Чхукха, Самчи, Самдруп-Джонкхар, Гейлег-фуг и Шемганг.	<i>P.falciparum</i>	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C) в рисковите райони.
5.	Бруней		Регистрирани са случаи на <i>P. knowlesi</i> малария при хора	<i>P. knowlesi</i>		Предпазване от ухапване на комари (A)
6.	Вануату	1-12	Повсеместно-от нисък до умерен риск от заразяване.	<i>P.falciparum</i> <i>P.vivax</i>	CHL, SP CHL	MEF, MAL, DOX (C)
7.	Грузия	6-10	Съществува ограничен риск от малария терциана в източната част на страната, граничеща с Азербейджан. Местни случаи на малария не са регистрирани от 2013 г.	<i>P.vivax</i>		Репеленти и защитни мрежи срещу комари. (A)
8.	Йемен	1-12	Повсеместно под 2000м. По-висок риск от заразяване има в периода септември-февруари.	<i>P.falciparum</i>	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C) в рисковите райони

			Няма риск в столицата Сана`а. Рискът на остров Сокотра е ограничен.			Репеленти и предпазни мрежи срещу комари на остров Сокотра. (А)
9.	Индия	1-12	Повсеместно под 2000 м с изключение на щатите Химачал Прадеш, Джаму, Кашмир и Сиким. Рискът от резистентен <i>P.falciparum</i> е по-висок в североизточните щати Андаман, островите Никобар, Кхатисгарх, Гуджарат, Джаркханд, Карнатака (с изключение на град Бенгалуру), Мадхя Прадеш, Махараштра (с изключение на градовете Мумбай, Нагпур, Насик и Пуне), Ориса и Западен Бенгал (с изключение на град Калкута).	<i>P.falciparum</i> (40-50%) <i>P.vivax</i> (50-60%)	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C) в рисковите райони
10.	Индонезия	1-12	Най-висок риск от малария има в пет източни провинции: Иист Нуса Тенгара, Малуку, Норт Малуку, Папуа и Уест Папуа. В останалите части на страната рискът е ограничен и сведен от нисък до несъществуващ в Джакарта, големите градове и повечето големи туристически обекти. Регистрирани са случаи на инфекция с <i>P.knowlesi</i> в провинция Калимантан.	<i>P.falciparum</i> <i>P.vivax</i>	CHL, SP CHL	MEF, MAL, DOX (C) в рисковите райони
11.	Иран	3-11	Риск от малария терциана (<i>P.vivax</i>) и много ограничен от малария тропика (<i>P.falciparum</i>) има в селските региони на провинциите Хормозган, Керман (тропическата част) и южната част на Систан-Балучестан.	<i>P.falciparum</i> <i>P.vivax</i>	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C) в рисковите райони
12.	Ирак	5-11	Ограничен риск в северните райони под 1500м (Духок, Ербил и Сулаймания). От 2009 г. няма регистрирани местни случаи на малария	<i>P.vivax</i>	-	Не се налагат мерки за защита
13.	Камбоджа	1-12	Повсеместно с изключение на Пном Пен и около Тонле Сап. Рискът от малария в туристическите райони на	<i>P.falciparum</i> <i>P.vivax</i>	CHL, SP, MEF в	MEF, MAL, DOX (D)

			Анкор Ват е минимален. Регистрирани са случаи на инфекция с щамове на <i>P.falciparum</i> , резистентни на artesunate, mefloquine, lumefantrine и piperaquine е установен в Западна Камбоджа и разпростираща се към централната част на страната резистентност на <i>P. vivax</i> към chlozoquine е установена в Източна Камбоджа.		западните провинции.	
14.	Китай	7-11	В провинции Хайнан и Юннан е разпространена малария тропика. Съобщава се за <i>P.falciparum</i> с множествена лекарствена резистентност. Ограничен риск от малария терциана съществува в някои южни и централни провинции като Анхуй, Гюизху, Хюбей, Хюнан, Янгсу. Не съществува риск в урбанизираните райони.	<i>P.falciparum</i> <i>P.vivax</i>	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C) – в Хайнан и Юннан. CHL (B) – в рисковите райони.
15.	Киргизстан	6 – 10	Риск от заразяване, основно с <i>P.vivax</i> от юни до октомври в някои южни и западни части на страната, главно в Баткен, Ош и област Джалалабадска, в райони, гранични на Таджикистан и Узбекистан и в предградията на Бишкек. От 2011 до 2013 г. няма регистрирани местни случаи на малария	<i>P.vivax</i>	-	Репеленти и защитни мрежи срещу комари. (A)
16.	Корейска Демократична Народна Република		Ограничен риск от заразяване в някои южни райони.	<i>P.vivax</i>	-	Репеленти и защитни мрежи срещу комари. (A)
17.	Република Корея		Ограничен риск от заразяване има главно в северните райони на провинциите Гангуонг - До и Гиеонджи – До и град Инчеон (до демилитизираната зона).	<i>P.vivax</i>	-	Репеленти и защитни мрежи срещу комари. (A)
18.	Руска Федерация		Съвсем ограничен риск съществува в райони, където има засилена миграция от южни съседни страни.	<i>P.vivax</i>	-	-
19.	Лаос	1-12	Повсеместно, освен във Виентиан.	<i>P.falciparum</i>	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)

20.	Малайзия	1-12	Риск има само в ограничени райони във вътрешността на щатите Сабах и Саравак и централните части на страната. В урбанизираните и крайбрежни райони няма малария. Регистрирани са случаи на инфекция с човешки <i>P. knowlesi</i> .	<i>P.falciparum</i>	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C) в рисковите райони.
21.	Мианмар /Бирма/	1-12	Целогодишно под 1000м надморска височина, в диви и селски хълмисти и гористи райони, както и някои крайбрежни зони на щата Рахкин. В градовете и урбанизираните райони липсва риск. Мефлокин резистентни щамове на <i>P.falciparum</i> са установени в щатите Кайян и Шан- източната част. Открити са щамове на <i>P.vivax</i> с резистентност към хлорокин. Регистрирани са и случаи на инфекция с <i>P.knowlesi</i> .	<i>P.falciparum</i> <i>P.vivax</i>	CHL, SP, MEF CHL	MEF, MAL, DOX (C) в рисковите райони. MEF, MAL, DOX (D) в югоизточен Мианмар
22.	Непал	1-12	В селските райони на областта Тераи (вкл. горите и горските селища) и особено пограничните зони с Индия. Опасността от зараза с <i>P.falciparum</i> е най-голяма през месеците от юли до октомври.	<i>P.vivax</i> <i>P.falciparum</i>	 CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C) в рисковите райони
23.	Оман	1-12	Спорадични случаи на трансмисии на <i>P.falciparum</i> и на <i>P.vivax</i> са докладвани до 2003г., през 2010г. са регистрирани ограничени взривове на <i>P.vivax</i> и <i>P.falciparum</i> малария в райони на Северна Шаркия. Спорадични случаи са докладвани през 2011 и 2012 г.	<i>P.falciparum</i> <i>P.vivax</i>	-	-
24.	Пакистан	1-12	Повсеместно под 2000м. и основно в селски райони от юли до декември	<i>P.falciparum</i> <i>P.vivax</i>	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C) -
25.	Папуа Нова	1-12	Повсеместно под 1800м. Регистрирана е резистентност	<i>P.falciparum</i>	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)

	Гвинея		на P.vivax съм хлорокин	P.vivax	CHL	
26.	Саудитска Арабия	1-12	Страната е в преелиминационна фаза на маларията. Спорадични случаи се регистрират в селски райони, в близост до границата с Йемен. Няма риск в Мека и Медина.	P.falciparum	CHL	MEF, MAL, DOX (C) в рисковите региони
27.	Сирия	5-10	Огнища има по протежението на северната граница, изключително в североизточната част на страната, особена в района Ел Хасака. Няма регистрирани местни случаи от 2005г.	P.vivax		-
28.	Сингапур		Регистрират се случаи на инфекция с P.knowlesi при хора.			Репеленти и защитни мрежи срещу комари. (A)
29.	Соломонови острови	1-12	Повсеместно с изключение на някои източно и южно разположени островчета.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C) в рисковите региони
30.	Виетнам	1-12	Повсеместно и цялогодишно с изключение на урбанизираните центрове, делтата на Червената река и делтата на Меконг, както и крайбрежните райони на Централен Виетнам. Област с висок риск са планинските райони под 1500м, южно от 18 ⁰ северна ширина, особено в централните провинции: Дак Лак, Джиа Лай, Кон Тум и Дак Нанк, Бин Фуок, както и западните части на крайморските провинции Куанг Три, Куанг Нам, Нинх Тхуан и Кхан Хоа.	P.falciparum	CHL, SP, MEF	MEF, MAL, DOX (C) в рисковите региони
31.	Таджикистан	6-10	Особено в южните гранични райони (Хатлон) и в някои централни (Душанбе), западни (Горен Бадакшан) и северни (Ленинабад) райони.	P.vivax P.falciparum	CHL, SP в южните части на страната	CHL (B) – в рисковите райони. MEF, MAL, DOX (C) в южните части на страната

32.	Тайланд	1-12	В селските райони, гористите и хълмисти райони на цялата страна и основно в пограничните райони, включително и най-южните провинции. Липсва риск в градовете и повечето туристически обекти /Бангкок, Чиангмай, Патайя, Пукет, Самуи/. Описана резистентност към мефлокин, артемизинин и хинин в граничните с Камбоджа и Мианмар райони. Регистрирани са случаи на инфекция с човешки P.knowlesi.	P.falciparum	CHL, SP	Репеленти и защитни мрежи срещу комари. (A) в големите градове и повечето туристически обекти. MEF, MAL, DOX (D) в граничните с Камбоджа и Мианмар райони.
33.	Тимор Лесте	1 – 12	Повсеместно.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)
34.	Туркменистан	6-10	В някои селища от югоизточната част на страната и около границата с Афганистан. Няма регистрирани случаи на автохтонна малария от 2006 г.	P.vivax	-	Репеленти и защитни мрежи срещу комари. (I)
35.	Турция	5-10	В югоизточната част на страната, основно в провинция Мардин. Няма риск в основните туристически обекти, в западната и югозападната части.	P.vivax	-	Репеленти и защитни мрежи срещу комари. (A) в рисковите райони
36.	Узбекистан		Спорадични, местни случаи на малария терциана в южната и източна част на страната. Няма регистрирани местни случаи за периода 2011 – 2013 г.	P.vivax	-	Репеленти и предпазни мрежи срещу комари. (A)
37.	Филипини	1-12	Риск съществува цялгодишно в областите под 600 м с изключение на 22 провинции като Аклан, Албей, Бенгует, Биларан, Бохол, Камигуин, Капиз, Катандуанес, Кавите, Себу, Гуимарас, Илойло, Северен и Южен Лейте, Мариндуке, Масбате, Източен, Северен и Западен Самар, Секвиьор, Сорсогон, Суригао Дел Норте и столицата Манила. Няма риск също в градските и равнинни райони. Докладван е случай на инфекция с човешки P.knowlesi в провинция Палаван.	P.falciparum	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C)

38.	Шри Ланка	1-12	Ограничен риск, с изключение на областите Коломбо, Галее, Гампаха, Калутара, Матара и Нюара Елия. Няма регистрирани местни случаи от октомври 2012 г.	P.vivax -88% P.falciparum-12%	CHL, SP	Репеленти и предпазни мрежи срещу комари (А) рисковите райони
1	<u>2</u>	3	4	5	6	7
ЛАТИНСКА АМЕРИКА						
1.	Аржентина		Рискът е малък и е ограничен в рамките на департаментите Оран и Сан Мартин в провинция Салта и по-малка степен в провинциите Кориентес и Мисионес. Останалите части на страната липсва риск, като случаи на малария не са регистрирани в последните години на територията на цялата страна.	P.vivax		Предпазване от ухапване от комари (А)
2.	Белиз	1-12	Съществува риск предимно от малария с причинител P.vivax в някои райони на Стан Крик и е незначителен в останалите части на страната.	P.vivax	-	Предпазване от ухапване от комари (А)
3.	Боливия	1-12	Малария терциана (P.vivax) под 2500м в цялата страна. P. falciparum, се открива в Санта Круз и северните райони Бени и Пандо. Особено засегнати са суб-районите Гуауарамерин, Кобиджа и Рибералта.	P.vivax - 94% P.falciparum-6%	CHL, SP	CHL, MAL, MEF (B) - в рисковите райони. MEF, MAL, DOX (C) в Санта Круз, Бени и Пандо.

4.	Бразилия	1-12	В щатите извън административния регион Амазонас, рискът от малария е от минимален до несъществуващ. Най-високо разпространение има в гористите райони под 900м надморска височина в девет щата от региона Амазонас: Акре, Амапа, Амазонас, Маранхао (западна част), Мато Гроссо (северна част), Пара (с изключение на град Белем), Рондония, Рораима и Токантис (западна част). Трансмисията е много интензивна в района на джунглата, миньорски, дърводобивни и селскостопански селища, които съществуват от скоро (по-малко от 5 години), както и в периферията на градовете Крузейро до Сул, Порто Велхо,и Манаус. Трансмисията на малария е установена и в покрайнините на големите градове като Боа Виста, Макапа, Мараба, Рио Бранко и Сантарем е главно в периферията на тези градове.	P.vivax 84%		MAL, DOX, DOX (C) в рисковите райони.
				P.falciparum 15%	CHL щамове на P.falciparu m с множество на лекарствен а резистентн ост	
				Смесена малария 1%		
6.	Венецуела	1-12	Малария терциана (P.vivax) и тропика (P.falciparum) са разпространени в някои селски райони на щатите Амазонас, Анзоатегуи, Боливар и Делта Амакуро. Понисък риск се отчита в Апуре, Монагас, Сукре и Зулиа. Опасността от малария тропика е по-голяма в джунглата на щатите Амазонас (Алто Ориноко, Атабапо, Атурсес, Аутана, Манапире, Рио Негро), Боливар (Карони, Кедено, Ел Калао, Херес, Гран Сабана, Пиар, Раул Леони, Роцио, Сифонтес и Сукре).	P.vivax (83%)		CHL, MAL, MEF (B)
				P.falciparum (16%)	CHL, SP	MAL, DOX, DOX (C) в изброените рискови райони.
7.	Гватемала	1-12	В местности под 1500м. целогодишно. Висок е рискът от заразяване с малария в департаментите Ескуинтла и Алта Верапаз. Нисък риск съществува в Байа Верапаз, Петен, Чикуимула, Изабела, Закапа и Сучитепекуез.	P.vivax	-	CHL, MAL, MEF (B) - в рисковите райони.
8.	Гвиана	1-12	Повсеместно във вътрешността на страната, като най-	P.falciparum	CHL	MAL, DOX, DOX (C)

			висок риск се наблюдава в региони 1, 7, 8, 9 и 10, среден риск в региони 2 и 3 и много нисък в 4, 5 и 6. Спорадични случаи се наблюдават в гъсто населените места от крайбрежните райони.	45% P.vivax 51% Смесени инфекции 4%		
9.	Доминиканска Република	1-12	Риск има предимно в западните провинции на Дажабон, Елиас Пина и Сан Хуан. В останалите райони рискът е малък до незначителен. Няма данни за резистентност на P.falciparum към някои от антималярийните препарати.	P.falciparum	-	CHL, MAL, MEF (B) - в рисковите райони.
10.	Еквадор	1-12	Целогодишно има риск в районите под 1500м, като съществува и умерена вероятност от трансмисия и в крайбрежните провинции. Висок риск от P.falciparum малария съществува в провинция Есмералда. Не съществува риск в Гуайакуил и Кито и градовете в региона на Андите.	P.falciparum 14% P.vivax 86%	CHL, SP	MAL, DOX (C) в рисковите райони.
11.	Колумбия	1-12	Висок риск съществува в департаментите Антиокия, Боливар, Каука, Чоко, Кордоба, Гуаджира, Нарино и Рисарлада. По-нисък риск съществува в общините Амазонас, Чакета, Гуавайре, Гуайния, Мета, Путумайо, Ваупес и Вичада. Докладвани са Chloroquine-резистентни щамове на P. falciparum	P.falciparum 27% P.vivax 72%	CHL, SP	MAL, DOX (C) в рисковите райони.
12.	Коста Рика	1-12	Нисък риск от заразяване с P.vivax има в провинциите на Лимон и основно в кантон Матина. Несъществен или никакъв риск от заразяване се наблюдава в другите кантони на страната.	P.vivax	-	Предпазни мерки за ухапвания от комари (A)
13.	Мексико	1-12	В някои селски райони, които рядко се посещават от туристи. Нисък риск от заразяване има в щата Чиापас и много нисък в областите Чихуахуа, Дуранго, Найярит, Куантана Роо и Синалоа.	P.vivax	-	Предпазване от ухапване от комари (A)
14.	Никарагуа	1-12	Риск от малария, предимно от P. vivax, съществува целогодишно. Нисък риск има в редица общини основно в Регион Автонома Атлантико Норте. Спорадична	P.falciparum P.vivax 92%	-	CHL, MAL, MEF (B) в рисковите райони.

			трансмисия се регистрира в Боака, Чинангеа, Жинотека, Леон и Матагалпа. Автохтонни случаи са докладвани и от други райони в централните и западните департаменти, но рискът в тези райони е много малък. Няма установена хлорокинова резистентност на <i>P.falciparum</i> .			
15.	Панама	1-12	Риск съществува цялгодишно в провинциите, намиращи се по протежението на атлантическото крайбрежие и по границата с Колумбия и Коста Рика: Бокас дел Торо, Чирихуй, Колон, Дариен, Нгобе Бугле, Панама и Верагвас. В градът Панама и Канал Зоне, както и в другите провинции, рискът е минимален.	<i>P.falciparum</i> 1% <i>P.vivax</i> - 99%	CHL в провинция Дариен и Сан Блас.	MAL, DOX (C) в източните ендемични райони. CHL, MAL, MEF (B) в рисковите райони.
16.	Парагвай	1-12	Среден интензитет на трансмисия в определени общини на департаментите Алто Парана и Каагуазу. В останалите 14 департамента рискът е незначителен или няма такъв.	<i>P.vivax</i>	-	Репеленти и предпазни мрежи срещу комари (A) в рисковите райони
17.	Перу	1-12	Рискът е цялгодишен в селските райони под 2000м надморска височина. 32 са областите с висок риск и те са концентрирани в окръзите Аякучо, Куско, Юнин и Лорето. Лорето е най-рисковият район с 98% от случаите на тропическа малария, както и другите департаменти, разположени покрай Амазония /вкл. 18 пристанищни селища/.	<i>P.falciparum</i> 16% <i>P.vivax</i> 84%	CHL, SP	MAL, DOX (C) в окръг Лорето. CHL, MAL, MEF (B)
18.	Салвадор (El Salvador)	1-12	Много нисък риск от заразяване в провинция Санта Ана и в селските райони, в които има миграция от Гватемала. Спорадични случаи на вивакс малария, обаче са докладвани и от други части на страната.	<i>P.vivax</i>	-	Репеленти и предпазни мрежи срещу комари (A)
19.	Суринам	1-12	Рискът е голям във вътрешността на страната, извън кайбрежната саванна област, като е най-голям по протежение на източната граница и в районите със златни мини. В град Парамарибо и останалите седем крайбрежни района, рискът е малък до незначителен.	<i>P.falciparum</i> 55% <i>P.vivax</i> 43% Смесена	CHL, SP, MEF, намалена чувствителност към	MAL, DOX (C) в рисковите региони.

				инф. 2%	хинин	
20.	Френска Гвиана	1-12	Висок риск в девет общини по границата с Бразилия (долината на река Ойяпоке) и до границата със Суринам (долината на река Марони). В други 13 общини рискът е нисък до незначителен. В районите с миграция от Бразилия се съобщава за щамове на <i>P.falciparum</i> с множествена лекарствена резистентност.	<i>P.falciparum</i> 45% <i>P.vivax</i> 55%	CHL, SP	MEF, MAL, DOX (C) в рисковите региони.
21.	Хаити	1-12	Рискът от малария е целогодишен в цялата страна, включително крайбрежните и граничните зони. Много нисък риск има само в градските райони на Порт о Пренс.	<i>P.falciparum</i>	-	CHL, MAL, MEF (B) в рисковите райони.
22.	Хондурас	1-12	Висок риск от малария терциана (<i>P.vivax</i>) има в провинциите Грацияс а Диос и среден в Атлантида, Ел Парайсо, Оланчо и Йоро. Рискът от <i>P.falciparum</i> е най-висок в Грацияс а Диос и умерен в Колон, Йоро и Оланчо.	<i>P.falciparum</i> 20% <i>P.vivax</i> 79%	-	CHL, MAL, MEF (B) - в рисковите райони.
23.	Ямайка	1-12	Много малък риск, но включително и от <i>P.falciparum</i> , в районите на Кингстън и Храма на Свети Андрю.	<i>P.falciparum</i>	-	Репеленти и защитни мрежи срещу комарите (A)

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

MEF: MEFLOQUINE
 CHL: CHLOROQUINE
 P: PROGUANIL
 DOX: DOXYCYCLINE
 SP: SULFADOXINE - PYRIMETHAMINE
 MAL: MALARONE (ATOVAQUONE + PROGUANIL)