

Класификация на риска от малария и вид на превантивните мерки (по СЗО 2015)

	Риск от малария	Вид на превантивните мерки
Тип А	Много нисък риск	Предпазни мерки за ухапвания от комари
Тип В	Риск само за <i>P. vivax</i> малария	Предпазване от ухапвания от комари плюс химиопрофилактика с chloroquine, или doxycycline или atovaquone–proguanil или mefloquine (изборът е съгласно данните за чувствителността на паразита, докладваните странични ефекти и контраиндикации) ^a
Тип С	Риск за <i>P. falciparum</i> малария и известна резистентност към chloroquine и sulfadoxine–pyrimethamine	Предпазване от ухапвания от комари плюс химиопрофилактика с atovaquone–proguanil или doxycycline или mefloquine (изборът е съгласно данните за докладваните странични ефекти и контраиндикации) ^a
Тип D	Риск за <i>P. falciparum</i> малария и докладвана мултилекарствена резистентност	Предпазване от ухапвания от комари плюс химиопрофилактика с atovaquone–proguanil или doxycycline или mefloquine (изборът е съгласно данните за докладваните странични ефекти и контраиндикации) ^{a, b}

a. Алтернативно за пътуващи в селски и слабо населени райони с риск от малария Тип А, предпазните мерки за ухапвания от комари могат да се съчетаят с възможност за провеждане на спешно лечение (stand-by emergency treatment – SBET)

b. В някои райони с множествена лекарствена резистентност, химиопрофилактика с мефлокин вече не се препоръчва. За момента това включва Камбоджа, Югоизточен регион на Мианмар и Тайланд.