

ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА НОВ КОРОНАВИРУС (2019-nCoV)

(Дефинициите се основават на информацията, налична към момента и може да се измени в резултат на събиране на нова информация).

Случай със съмнение за нов коронавирус (Възможен случай)

А. Болен с тежка остра респираторна инфекция (треска, кашлица и необходимост от хоспитализация),

И

без друга етиология, която напълно да обяснява клиничната картина и поне едно от следните две:

- анамнеза за пътуване или пребиваване в гр. Ухан, провинция Хубей, Китай, 14 дни преди появата на симптоми

ИЛИ

- заболяният е медицински персонал, работил в среда, където се полагат грижи за пациенти с тежки остри респираторни инфекции с неизвестна етиология.

Б. Болен с остро респираторно заболяване

И поне едно от следните:

- близък контакт с потвърден или вероятен случай с 2019-nCoV 14 дни преди появата на болестта

ИЛИ

- посещение или работа на пазар на живи животни в гр. Ухан, провинция Хубей, Китай, 14 дни преди появата на симптоми

ИЛИ

- посещение или работа в лечебно заведение, в което са съобщени случаи на вътреболнично предаване на 2019-nCoV, 14 дни преди появата на симптомите,

Близкият контакт се определя като:

- излагане на болнична експозиция, включително полагане на директни грижи за пациент с nCoV, работа с медицински персонал, заразен с nCoV, посещение на пациенти или престой в същата среда с пациент с nCoV;
- работа в непосредствена близост или споделяне на едно помещение с пациент с nCoV;

- пътуване заедно с пациент с nCoV във всякакъв вид транспортно средство;
- съжителство в едно домакинство с пациент с nCoV.

За епидемиологична връзка може да се приемат 14 дни преди или 14 дни след появата на оплаквания.

Вероятен случай

Съмнителен случай, за който тестването за 2019-nCoV е неубедително или тестването за коронавируси е с положителен резултат.

Потвърден случай

Случай с лабораторно потвърдена инфекция с 2019-nCoV, независимо от клиничните симптоми

Критерии за тестване за 2019-nCoV:

Навременното лабораторно потвърждаване на случаите е необходимо за осигуряване на бързо и ефективно издирване на контактните, прилагане на протиепидемични мерки и мерки за контрол на инфекциите, съгласно националните препоръки и събиране на необходимата епидемиологична и клинична информация.

Всяко лице, което отговаря на критериите за съмнителен случай, трябва да бъде изследвано за 2019-nCoV. Лабораторното изследване трябва да започне незабавно.